



**amniocentese
bvc**
(biópsia das vilosidades coriónicas)

informação às grávidas

Hospital de São Teotónio, EPE

Serviço de Obstetrícia - Unidade de Medicina Fetal
Av. Rei D. Duarte 3504-509 - Viseu
Tel: 232 420 500



www.umfetal.com

info@umfetal.com

tel: 232 480 267



biópsia das vilosidades coriônicas (bvc) às 11 – 15 semanas

O que são as vilosidades coriônicas e para que serve a BVC?

As vilosidades coriônicas são estruturas da placenta. A BVC serve para determinar o cariótipo fetal (cromossomas do bebé). Tanto a placenta como o bebé se originam a partir da mesma célula por isso estudando os cromossomas da placenta ficamos a saber como são os cromossomas do bebé.

Como se faz a BVC?

O médico começa por fazer uma pequena anestesia local na pele da barriga. Depois com uma agulha fina que atravessa a parede do útero até à placenta retira-se uma pequena amostra que depois vai para análise. Todo o procedimento é monitorizado por ecografia e dura 1 a 2 minutos. No final o médico mostrar-lhe-á os batimentos cardíacos fetais.

Que cuidados devo ter depois da BVC?

Não precisa de nenhum cuidado especial! Pode prosseguir com a sua vida normal, não é necessário repouso. Nos primeiros dias é normal sentir dor de barriga (semelhante às dores menstruais) ou até uma pequena perda de sangue. Isto é muito comum e a esmagadora maioria das gravidezes prossegue sem problemas. Se tiver dor intensa, hemorragia abundante ou febre deve contactar o seu médico.

Quando é que ficam prontos os resultados?

Os resultados para os problemas mais graves e frequentes (Trissomia 21 ou Síndrome de Down, Trissomia 13 ou Síndrome de Patau e Trissomia 18 ou Síndrome de Edwards) ficam prontos em 3 dias úteis. Telefonar-

-lhe-emos assim que tivermos os resultados e seremos capazes de lhe dizer se há ou não algum destes problemas e, se o desejar, podemos informá-la do sexo do bebé. O resultado final demora 2 a 3 semanas e pode identificar pequenas alterações ou situações mais raras que não foram identificadas no primeiro teste. Em cerca de 1% dos casos os resultados são inconclusivos e o procedimento pode ter de ser repetido.

Quais são os riscos associados à BVC?

O risco de abortamento devido à BVC é de 1% (1:100) e é semelhante ao risco da amniocentese às 16 semanas. Existe também um muito pequeno risco de infecção de cerca de 1‰ (1:1000). No caso de hemorragia vaginal abundante ou febre nos dias seguintes ao procedimento deve contactar o seu médico.

amniocentese

A amniocentese é uma técnica invasiva que consiste em introduzir uma agulha na barriga até chegar ao útero para retirar uma pequena quantidade de líquido amniótico. O líquido amniótico é o líquido que rodeia o feto e é constituído essencialmente por urina fetal, pelo que o líquido extraído será recuperado em poucos dias.

A amniocentese dá as mesmas informações que a Biópsia das Vilosidades Coriônicas (BVC). A diferença é que a amniocentese só deve ser feita a partir das 16 semanas e a BVC pode ser feita muito mais cedo, a partir das 11 semanas.

Os resultados preliminares ficam prontos em 3 dias úteis e o resultado definitivo demorará cerca de 2 a 3 semanas.

O risco de abortamento devido à amniocentese é de cerca de 1%.

RESULTADOS NORMAIS

A maioria das grávidas que fazem BVC ou amniocentese terá um resultado normal, a sua gravidez prosseguirá sem problemas e terão um bebé saudável. No entanto, um resultado normal não exclui a possibilidade de outras anomalias e nalguns casos (por exemplo se a translucência da nuca estiver aumentada) poderão ser precisas mais ecografias para vigiar a evolução do seu bebé.

RESULTADOS ANORMAIS

Infelizmente em alguns casos os resultados da BVC ou da amniocentese são anormais. Será contactada assim que obtivermos o resultado e dar-lhe-emos toda a informação que desejar. O primeiro contacto será telefónico mas ser-lhe-á também marcada uma consulta na Unidade de Medicina Fetal onde a ajudaremos a perceber o resultado e o seu significado.

Se decidir continuar com a gravidez realizaremos novas ecografias para monitorizar o seu bebé e melhor decidir sobre o tempo, local e tipo de parto. Podemos ainda indicar-lhe algumas associações que a poderão apoiar depois do nascimento.

Se a sua decisão passar pela interrupção da gravidez pode também contar com o nosso apoio. Serão tomadas as medidas necessárias para o procedimento e pode contar com apoio psicológico se assim o desejar.